

DOAK (direkte orale antikoagulantia)

Information til patienter, der opstarter antikoagulationsbehandling (AK) med DOAK.





Rivaroxaban (Xarelto)



20 mg x 1 dagligt

Dosis

Xarelto gives 1 x dagligt.



20 mg x 1 dagligt

OBS: Dosis ved venøs tromboemboli

15 mg x 2 dagligt i 3 uger, hvorefter dosis reduceres til 20 mg x 1 dagligt.



Almindelige bivirkninger

- Blødninger
- Hovedpine
- Træthed
- Svimmelhed
- Gastrointestinale gener



Særlige forholdsregler

- Skal tages sammen med et hovedmåltid (hvis præparatet tages uden mad, optages kun ca. 65% af medicinen).
- Skal tages på samme tidspunkt hver dag.


6/12
timersreglen

Har du glemt en dosis?

Patienter skal informeres om, at de kan nå at tage tbl. inden for enten 6 timer (dosis 2 x daglig) eller 12 timer (dosis 1 x daglig) fra planlagt tidspunkt.


Der skal min. gå 6 timer eller 12 timer mellem hver dosering, da der ellers er risiko for overdosering.

Apixaban (Eliquis)



Dosis

Apixaban gives 2 x dagligt.



OBS: Dosis ved venøs tromboemboli (f.eks. DVT og lungeemboli)

10 mg x 2 dagligt i 7 dage, hvorefter dosis reduceres til 5 mg x 2 dagligt.



Almindelige bivirkninger

- Blødninger
- Kvalme
- Hududslæt



Særlige forholdsregler

Skal tages på samme tidspunkt hver dag.

6


timersreglen

Har du glemt en dosis?

Patienter skal informeres om, at de kan nå at tage tbl. inden for 6 timer fra planlagt tidspunkt.

Der skal min. gå 6 timer mellem hver dosering, da der ellers er risiko for overdosering.

Dabigatranetexilat (Pradaxa)



Dosis


Dabigatranetexilat gives 2 x dagligt.

Dag 1 - 5

LMH



Fra dag 6



OBS: Dosis ved venøs tromboemboli (f.eks. DVT og lungeemboli)

150 mg x 2 dagligt forudgået af 5 dages LMH (SC injektion).



Almindelige bivirkninger

- Blødninger
- Mavesmerter
- Hårtab (alopeci)
- Purpura/Vasculitis der udløser bindvævssygdom og misfarvning af hud



Særlige forholdsregler

- OBS: Indtagelse af kapslerne - tjek pro.medicin.dk
- Må ikke doseres i doseringsæsker - skal tages med det samme de tages ud af pakningen
- Skal tages på samme tid hver dag

6

timersreglen

Har du glemt en dosis?

Patienter skal informeres om, at de kan nå at tage kapslen inden for 6 timer fra planlagt tidspunkt.

Der skal min. gå 6 timer mellem hver dosering, da der ellers er risiko for overdosering.

Edoxaban (Lixiana)



Dosis

Lixiana gives 1 x dagligt.

OBS: Dosis ved venøs tromboemboli (f.eks. DVT og lungeemboli)

60 mg x 1 dagligt forudgået af 5 dages LMH (SC injektion).



Almindelige bivirkninger

- Blødninger
- Leverpåvirkning
- Svimmelhed
- Hårtab (alopeci)
- Purpura/Vasculitis der udløser bindevævssygdom og misfarvning af hud



Særlige forholdsregler

Skal tages på samme tidspunkt hver dag.


12 timersreglen

Har du glemt en dosis?

Patienter skal informeres om, at de kan nå at tage tbl. inden for 12 timer fra planlagt tidspunkt.

Der skal min. gå 12 timer mellem hver dosering, da der ellers er risiko for overdosering.


Generelt om DOAK



Blodprøvekontrol


Ved påbegyndelse af DOAK-behandling måles hæmoglobin, væsketal inkl. eGFR, trombocytter og levertal.

Nyrefunktionen skal kontrolleres efter tre måneders behandling og herefter en til to gange årligt.



OBS reduceret dosis

Forhold som patientens alder, nyrefunktion og vægt har betydning for dosis på DOAK.



Vederlagsfri udlevering

Der findes enkelte patientgrupper, der er berettiget til at få deres DOAK udleveret uden at betale. Det kalder man vederlagsfri udlevering.

Sundhedspersonalet skal udlevere nok medicin (2-4 uger) indtil første vederlagsfrie udlevering ligger klar. Patienterne skal informeres om, hvor de henter ny medicin, hvis de løber tør inden levering fra sygehusapotek kan hentes.



Se E-dok "[Vederlagsfri medicin - Information til samarbejdspartnere](#)"