

AK-LOMMETIPS

Følgende patienter kan henvises til Tromboseklinikken (TK):

- Patienter med venøs tromboemboli
- Patienter med blødningskomplikationer til AK-behandling
- Patienter med trombofilisygdomme
- Opstart af Marevan til patienter i AUHs optageområde
- Patienter med dysreguleret INR
- Skift fra én AK-type til en anden



Ved henvisning til TK er det vigtigt at:

- Udfylde **SFI "Antikoagulation, behandlingsplan"**
- Lægge patientdata på **patientlisten** i EPJ **"Trombose-henvisning til AK-spl-Hjertesygdomme klinik AUH"**

Ved Fragmin behandling:

Der skal udleveres min. 10 stk. Fragmin sprøjter til patienten.

Kontakt gerne Tromboseklinikken på tlf. 4012 7473

AK-LOMMETIPS

5 punkter du skal overveje forud for ordination af AK-behandling:

1. Indikation
2. Kontraindikation
3. Dosering
4. Interaktion
5. Opfølgning



Husk - stillingtagen til varighed af AK-behandling.

Når der ordineres Marevan:

- Vær opmærksom på compliance
- Kan patienten komme til INR kontrol på AUH
- Husk at lave aftale med TK ift. den første INR kontrol ved opstart af Marevan

DOAK (=NOAK) må ikke anvendes til:

Mekaniske hjerteklapper –
Mitralstenose (moderat til svær) – Svær nyresvigt –
Graviditet og amning – Antifosfolipidsyndrom.



Se mere på:

AK-behandling.rm.dk