

## AK-LOMMETIPS



### **Patienter der skal henvises til egen læge eller Hjersteklinikken:**

Alle, som er **ny-ordinerede i AK-behandling** med præparaterne:

- Marevan
- Eliquis – Xarelto – Pradaxa – Lixiana
- Lavmolekylært heparin

### **Der kan henvises patienter med:**

- Opstart af Marevan og Fragmin
- Dysreguleret INR
- Skift fra en AK-type til en anden

### **DOAK (=NOAK) må ikke anvendes til:**

Mekaniske hjerteklapper –  
mitralstenose (kun moderat og svær) – svært  
nedsat nyrefunktion – graviditet og amning –  
antifosfolipidsyndrom.

### **5 punkter du skal overveje forud for ordination af AK-behandling:**

1. Indikation
2. Kontraindikation
3. Dosering
4. Interaktion
5. Opfølgning



Husk - stillingtagen til varighed af AK-behandling.

## AK-LOMMETIPS

### **Skal patienten følges med sin AK-behandling:**

Husk at lave aftale herom **inden** udskrivelse.

Når der ordineres Marevan:

- Vær opmærksom på compliance
- Kan patienten komme til INR kontrol ved egen læge

**OBS!** Afdelingen har et lager af forfyldte Fragmin sprøjter i alle styrker, der skal udleveres mindst 10 stk. ved udskrivelse, derefter udfyldes recept på videre behandling, som Faxes.

**Kontakt gerne Koordinater på afdelingen for yderligere spørgsmål på tlf. 21805.**



Se mere på:

**[AK-behandling.rm.dk](https://ak-behandling.rm.dk)**